

EC FERTILIZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ
Bor-Ca

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:

Bor-Ca ;

- Kalsiyum (Ca) ve Bor (B) içeren sıvı formda bir bitki besin maddesi formülasyonudur.
- Bitkilerin Kalsiyum (Ca) ve Bor(B) ihtiyaçlarını karşılamada ve noksanlığını gidermede kullanılmak üzere tasarlanmış olan Bor-Ca, bitki bünyesine hızla alınabilen bir gübredir.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Suda Çözünür Kalsiyum oksit (CaO):	15
Suda Çözünür Bor (B):	1

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

BİTKİLER	UYGULAMA DÖNEMİ	TOPRAKTAN	YAPRAKTAN (100 L su)
Sera Sebzeçiliği Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Bezelye	15 günde bir uygulama	1,5 -2 L/da (2-2,7 kg)/da	300-400ml (405-540g)
Açık Alan Sebzeçiliği Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Bezelye	15 günde bir uygulama	1,5 -2 L/da (2-2,7 kg)/da	300-400ml (405-540g)
Çilek	15 günde bir uygulama	1,5 -2 L/da (2-2,7 kg)/da	300-400ml (405-540g)
Kavun, Karpuz, Kabak	15 günde bir uygulama	1,5 -2 L/da (2-2,7 kg)/da	300-400ml (405-540g)
Meyve Ağaçları	15 günde bir uygulama	1,5 -2 L/da (2-2,7 kg)/da	300-400ml (405-540g)
Antep Fıstığı	Meyve oluşumundan sonra bir uygulama (yapraktan)		300-400ml (405-540g)
Asma	15 günde bir uygulama	1,5 -2 L/da (2-2,7 kg)/da	300-400ml (405-540g)
Endüstri Bitkileri	15 günde bir uygulama	1,5 -2 L/da (2-2,7 kg)/da	300-400ml (405-540g)
Kesme Çiçekçilik	15 günde bir uygulama	1,5 -2 L/da (2-2,7 kg)/da	300-400ml (405-540g)

UYARILARI

*Önce Etiket Okuyunuz.*Yutmayınız.*Evde Kullanmayınız.*Uygulama sırasında Hiçbir Şey yemeyiniz. *Deri ve Göz ile Temasından Kaçınınız.*Kaza ile Teması halinde derhal bol sabunlu su ile yıkayınız ve medikal gözlem altına alınız. *Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.*Teknik bilgi almadan asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Depolama Sıcaklığı: +4/+40°C

KARIŞILIRLIĞI

Fosfat ve Sülfat içerikli bileşikler, Nitrik ve Fosforik asit gibi mineral asitler, bakır veya mineral yağlar ile karıştırmayınız.

FİRMA BEYANI

ASANTA TARIM ENDÜSTRİ DIS TIC. LTD. STİ. Firması bu ürünün etiketinde bulunan kompozisyonu ve içeriği garanti eder. Firmanın kontrolü dışında yapılan manipülasyon, karışım, uygulama hataları, depolama ve iklimsel faktörlerden dolayı oluşabilecek olan zararlardan sorumlu değildir.

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ / KEEP AWAY FROM CHILDREN



Bor-Ca

Üretici Firma / Manufacturer



ASANTA TARIM ENDÜSTRİ
DIŞ TİC.LTD.ŞTİ

Çağlayan Mah.Barınaklar Blv.
Villa Güneş Apt. No:46/3
Muratpaşa/ANTALYA

TEL : +90 242 324 34 99
FAX : +90 242 324 34 99

www.asantatarim.com

İBRAHİM TOLGA ULUŞAN

ASANTA TARIM ENDÜSTRİ DIS
TİCARET LIMITED ŞİRKETİ
ÇAĞLAYAN MAH. BARINAKLAR BLV.
VİLLA GÜNEŞ NO:46/3 MURATPAŞA/ANTALYA
V. NO: 0866478427

Lisans No / Licence no: 1247
Tescil No / Registry no:
Üretim Tarihi/Production date:
Son Kul. Tarihi /Expiry date:
Parti ve Seri No/Parti & Serial no:

(Üretim Tarihi ve Parti No, etiket
veya kapak üzerinde yazmaktadır./
Production Date and Part No are on
the label or lid.)

1 L : 1,35 kg

NET AĞIRLIK / NET WEIGHT

EC FERTILIZER
CALCIUM CHLORIDE SOLUTION
Bor-Ca

FEATURES

Bor-Ca ;

- It is a plant nutrition formula in liquid form that contains pure form of Calcium (Ca) and Boron (B).
- Bor-Ca is a fertilizer designed to be used to resolve the deficiency of Calcium (Ca) and Boron (B) which can be taken quickly into the plant and to meet the needs of Calcium& Boron of plants.

GUARANTEED CONTENTS	% W/W
Water Soluble Calcium oxide (CaO):	15
Water Soluble Boron (B):	1

APPLICATION METHODE AND DOSE

CROPS	Application Period	Via SOIL	Via FOLIAR (100 L water)
Greenhouse Vegetables (Tomatoes, peppers, eggplants, cucumbers, beans, peas)	One treatment every 15 days	1,5 -2 L/da (2-2,7 kg)/da	300-400ml (405-540g)
Open Area Vegetables (Tomatoes, peppers, eggplants, cucumbers, beans, peas)	One treatment every 15 days	1,5 -2 L/da (2-2,7 kg)/da	300-400ml (405-540g)
Strawberries	One treatment every 15 days	1,5 -2 L/da (2-2,7 kg)/da	300-400ml (405-540g)
Melon, Watermelon, Pumpkin	One treatment every 15 days	1,5 -2 L/da (2-2,7 kg)/da	300-400ml (405-540g)
Fruit Trees	One treatment every 15 days	1,5 -2 L/da (2-2,7 kg)/da	300-400ml (405-540g)
Pistachios	One treatment after fruit formation (Via foliar)		300-400ml (405-540g)
Vine	One treatment every 15 days	1,5 -2 L/da (2-2,7 kg)/da	300-400ml (405-540g)
Industrial Crops	One treatment every 15 days	1,5 -2 L/da (2-2,7 kg)/da	300-400ml (405-540g)
Cut Flowers	One treatment every 15 days	1,5 -2 L/da (2-2,7 kg)/da	300-400ml (405-540g)

REMARKS!

*First, read the label.*Do not drink.*Do not use in house.*Do not eat anything during application.*Keep away from eye and skin contact.*By accident contact condition, wash your hands with plenty soapy water and call a doctor and show him the label or the pack. * Use only on needful place.*Never don't use over recommended dosage. Store under normal conditions (cool and dry places) in the original packaging. It is recommended to use fertilizer by making soil and / or leaf analysis. Storage temperature: +4/+40 °C

MIXABILITY

Do not mix with compounds containing sulphates and phosphates, mineral acids such as Nitric or Phosphoric acids, coppers or mineral oils.

STATEMENT OF THE FIRM

ASANTA TARIM ENDÜSTRİ DIS TIC. LTD. STİ. guarantees the composition of the product and suitability for the purposes that are pursued and will never be held responsible of damage caused by any incorrect use of the product ,inadequate storage, climate condition, any incorrect handling, mixing or application, etc.

TAAHHÜTNAME : Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği, etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.