

POTASYUM ÇÖZELTİSİ

Kalium-K

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:

Kalium-K, bitkilerin tarımsal uygulamalarda Potasyum (K) ihtiyacını karşılamak için tasarlanmış, yaprak ve topraktan uygulanabilen, bitki tarafından yüksek emilim özelliğine sahip iyi bir potasyum kaynağı sıvı bir gübredir.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK % W/W

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O): 25

BİTKİLER	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU
Kavun-Karpuz	Yapraktan püskürtme	Meyve oluşumundan sonra 2 uygulamaya	500 ml (650g) /da.
Buğday - Arpa	Yapraktan püskürtme	Sapa kalkma döneminde	500 ml (650g) /da.
		Başak oluşum devresinde	300-500 ml (390-650g) / da.
Şeftali, Erik, Kayısı, Kiraz, Vişne, Elma, Ayva	Yapraktan püskürtme	Çekirdek sertleşme döneminde	300 ml (390g) / 100 L su
Karnabahar, Brokoli, Enginar, Lahana	Yapraktan püskürtme	Baş bağlama döneminde	500 ml (650g) / 100L su
Patates, Domates, Hıyar,	Damlamadan	İlk çiçekten hasada kadar	2 L (2,6kg) /da.
Biber, Patlıcan, Prasa, Fasulye v.b.	Damlamadan	Hasat döneminde	3 L (3,9kg) /da.
Çilek	Damlamadan	Meyve, normal büyüklüğe ulaşana kadar.	1,5 L (2kg) /da.
		Ürün hasadı başlayınca, Haftada bir	2 L (2,6kg) /da.
Sera Bitkilerinde	Damlamadan haftada bir	Çiçek öncesi dönemde	1 L (1,3kg) /da.
		Meyve döneminde	2 L (2,6kg) /da.

UYARILAR!

*Önce Etiket Okuyunuz.*Yutmayınız.*Evde Kullanmayınız.*Uygulama sırasında Hiçbir Şey Yemeyiniz.*Deri ve Göz ile Temasından Kaçınınız.*Kaza ile Teması halinde derhal bol sabunlu su ile yıkayınız ve medikal gözlem altına alınız. Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Depolama Sıcaklığı: +4/+40°C

KARIŞABİLİRLİĞİ

Bakır, kalsiyum sülfat karışımları, oksitleyicilerle, güçlü asitlerle ve bazılarla karıştırmayınız. Mineral yağlarla ön deneme yapmadan kullanmayınız. Tarım ilaçları, yaprak gübreleri ve mikro besin maddeleriyle karıştırılarak kullanılabilir. Tek başına uygulanması tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI

ASANTA TARIM ENDUSTRI DIS TIC.LTD. STI. firması bu ürünün etiketinde bulunan kompozisyonu ve içeriği garanti eder. Firmanın kontrolü dışında yapılan manipülasyon, karışım, uygulama hataları, depolama ve iklimsel faktörlerden dolayı oluşabilecek olan zararlardan sorumlu değildir.

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ / KEEP AWAY FROM CHILDREN



Kalium-K

Üretici Firma / Manufacturer



ASANTA TARIM ENDÜSTRİ
DİŞ TİC.LTD.ŞTİ

Çağlayan Mah.Barınaklar Blv.
Villa Güneş Apt. No:46/3
Muratpaşa/ANTALYA

TEL : +90 242 324 34 99

FAX : +90 242 324 34 99

www.asantatarim.com

İBRAHİM TOLGA ULUŞAN

ASANTA TARIM ENDÜSTRİ DİŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÇAĞLAYAN MAH. BARINAKLAR BLV.
VİLLA GÜNEŞ NO:46/3 MURATPAŞA/ANTALYA
V. NO: 0860478427

Lisans No / Licence no: 1247

Tescil No / Registry no:

Üretim Tarihi/Production date:

Son Kul. Tarihi /Expiry date:

Parti ve Seri No/Parti & Serial no:

(Üretim Tarihi ve Parti No, etiket veya kapak üzerinde yazmaktadır./ Production Date and Part No are on the label or lid.)

1 L : 1,29 KG

NET AĞIRLIK / NET WEIGHT

POTASSIC SOLUTION

Kalium-K

FEATURES:

Kalium-K is a good potassium source and liquid fertilizer with a highly absorption property by the plants which applied via leaves and soil, designed to meet the potassium (K) requirement of plants in agricultural applications

GUARANTEED CONTENTS % W/W

Water Soluble Potassium Oxide (K₂O) 25

CROPS	APPLICATION TYPE	APPLICATION PERIOD	APPLICATION DOSAGE
Melon-Watermelon	Foliar spraying	After fruit formation ,2 applications	500 ml (650g) /da.
Wheat-Barley	Foliar spraying	In the stem elongation period	500 ml (650g) /da.
		in spike formation period	300-500 ml (390-650g) / da.
Peach, Plum, Apricot, Cherry sour, Apple, Quince	Foliar spraying	in stone hardening period	300 ml (390g) /100 L water
Cauliflower, Broccoli, Artichoke, Cabbage	Foliar spraying	In heading time	500 ml (650g) /100 L water
Potato, Tomato, Cucumber,	Through drip irrigation	From first flower to harvest	2 L (2,6kg) /da.
Pepper, Eggplant, Leek, Bean etc.	Through drip irrigation	In harvest period	3 L (3,9kg) /da.
Strawberry	Through drip irrigation	Until fruit grows to its normal size	1,5 L (2kg) /da.
		When harvest begins, Once a week	2 L (2,6kg) /da.
Greenhouse plants	Through drip irrigation Once a week	In the period before flower	1 L (1,3kg) /da.
		In fruit period	2 L (2,6kg) /da.

REMARKS!

*First, read the label.*Do not drink.*Do not use in house.*Do not eat anything during application.*Keep away from eye and skin contact.*By accident contact condition, wash your hands with plenty soapy water and call a doctor and show him the label or the pack. * Use only on needful place.*Never don't use over recommended dosage. . It is recommended to use fertilizer by making soil and / or leaf analysis Store under normal conditions (cool and dry places) in the original packaging. Storage temperature : +4/+40 °C

MIXABILITY

Do not mix with coppers, calcium sulphates mixtures, oxidants and strong acids and bases. Do not use with mineral oils without a previous essay. It can be mixed with pesticides,foliar fertilizers and micro-nutrients. It is recommended to apply alone.

STATEMENT OF THE FIRM

ASANTA TARIM ENDUSTRI DIS TIC. LTD. STI. guarantees the composition of the product and suitability for the purposes that are pursued and will never be held responsible of damage caused by any incorrect use of the product ,inadequate storage, climate condition, any incorrect handling, mixing or application, etc).

TAAHHÜTNAME

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği, etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.