

EC FERTILIZER  
DEMİR TUZU  
(DEMİR SULFAT İÇERİKLİ)  
**MicroFer 13+AS**

**ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:**

- \*Toprağın ve bitkinin demir eksikliğini giderir,
- \*Toprakta mevcut olan besinlerin bitki bünyesine alınmasını kolaylaştırır.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% w/w
Suda Çözünür Demir (Fe)	13

TOPRAKTAN UYGULAMA METODU VE DOZAJI		
BİTKİLER	UYGULAMA DÖNEMİ	DOZAJ
SEBZELER	Bitki gelişim dönemi boyunca : 2-3 uygulamada verilir.	300-800 g/da
MEYVE AĞAÇLARI	Kış sezonu sonunda ; 2 uygulamada verilir.	500-1000 g/da
NARENCİYE	Sürgün döneminden başlanarak 2-3 uygulamaya bölünerek verilir.	Ağaç büyüklüğüne göre; 50-100 g/ağaç
ANTEP FISTIĞI	İlkbahar başlangıcında ; 2 uygulamada verilir.	1000-2000 g/da
BAĞLAR	İlkbahar başlangıcında ; 2 uygulamada verilir.	1000-2000 g/da
ÇİLEK	Bitki gelişim döneminin başından itibaren 2 uygulama	500-1000 g/da
TARLA BİTKİLERİ	Eksiklik belirtileri görüldüğünde	300-500 g/da

**YAPRAKTAN UYGULAMA METODU VE DOZAJI :**  
Eksiklik belirtileri görülmeye başlandığında her uygulamada 100-150 g/da

**UYARILAR !**

\*Önce Etiket Okuyunuz.\*Yutmayınız.\*Evde Kullanmayınız.\*Uygulama sırasında Hiçbir Şey Yemeyiniz.\*Deri ve Göz ile Temasından Kaçınınız.\*Kaza ile Teması halinde derhal bol sabunlu su ile yıkayınız ve medikal gözlem altına alınız.\*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. \*Asla uygun doz oranını aşmayınız.\*Sadece gerekli yerlerde kullanınız.\*Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. \*Depolama Sıcaklığı: +4/+40°C \*.

**KARIŞABİLİRLİĞİ**

Bakır, kalsiyum sülfat karışımları ile karıştırmayınız. Mineral yağ ve asitlerle ön deneme yapmadan kullanmayınız. Tarım ilaçları, yaprak gübreleri ve mikro besin maddeleriyle karıştırılarak kullanılabilir.

**FİRMA BEYANI**

ASANTA TARIM ENDÜSTRİ DIS TIC. LTD. STI. Firması bu ürünün etiketinde bulunan kompozisyonu ve içeriği garanti eder. Firmanın kontrolü dışında yapılan manipülasyon, karışım, uygulama hataları ve iklimsel faktörlerden dolayı oluşabilecek olan zararlardan sorumlu değildir.

# MicroFer 13 +AS

Üretici Firma/Manufacturer



ASANTA TARIM ENDÜSTRİ DİŞ  
TİC.LTD.ŞTİ  
Çağlayan Mah. Barınaklar Blv.Villa Güneş  
Apt.No:46/3 Muratpaşa/ANTALYA  
TEL&FAX : +90 242 324 34 99  
[www.asantatarim.com](http://www.asantatarim.com)

İBRAHİM TOLGA ULUŞAN

ASANTA TARIM ENDÜSTRİ DİŞ  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
ÇAĞLAYAN MAH. BARINAKLAR/BLV.  
VİLLA GÜNEŞ NO:46/3 MURATPAŞA/ANTALYA  
V. NO: 0860478427

Lisans No / Licence no: 1247  
Tescil No / Registry no:  
Üretim Tarihi/Production date:  
Son Kul. Tarihi /Expiry date:  
Parti ve Seri No/Parti & Serial no:

**NET AĞIRLIK /Net Weight:**

**ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ!  
/ KEEP AWAY FROM CHILDREN!**



EC FERTILIZER  
IRON SALT  
(CONTENT: IRON SULFATE)  
**MicroFer 13+AS**

**FEATURES:**

- \*Resolves iron deficiency of the soil and plant.
- \*Facilitates uptake the nutrients existing in the soil for plants.

GUARANTEED CONTENTS	% w/w
Water Soluble Iron (Fe)	13

APPLICATION METHOD AND DOSE VIA SOIL		
CROPS	APPLICATION PERIOD	DOSE
VEGETABLES	During the period of plant development ; is given with 2-3 application.	300-800 g/da
FRUIT TREES	At the end of the winter season; is given with 2 application.	500-1000 g/da
CITRUS	Starting from branch elongation period ; is given by dividing to the 2-3 application	According to the size of the tree; 50-100 g/tree
PISTACHIO	At the beginning of spring; is given with 2 application.	1000-2000 g/da
VINEYARDS	At the beginning of spring; is given with 2 application.	1000-2000 g/da
STRAWBERRY	From the beginning of the period of plant growth ; 2 application	500-1000 g/da
CEREALS	When deficiency symptoms appear	300-500 g/da

**APPLICATION METHOD AND DOSE VIA FOLIAR:**  
When deficiency symptoms begin to appear: in each application; 100-150 g / da

**REMARKS !**

\*First, read the label.\*Do not drink.\*Do not use in house.\*Do not eat anything during application.\*Keep away from eye and skin contact.\* By accident contact condition, wash your hands with plenty soapy water and call a doctor and show him the label or the pack. It is recommended to use fertilizer by making soil and / or leaf analysis. \*Use only on needful place. \*Never don't use over recommended dosage.\*Storage temperature: +4/+40 °C

**MIXABILITY**

Do not mix with coppers, sulphocalcic mixtures as with calcium, or with mineral oils without a previous essay. It can be mixed with pesticides, foliar fertilizers and micro-nutrients.

**STATEMENT OF THE FIRM**

ASANTA TARIM ENDÜSTRİ DIS TIC. LTD. STI. guarantees the composition of the product and suitability for the purposes that are pursued and will never be held responsible of damage caused by any incorrect use of the product ,inadequate storage, climate condition, any incorrect handling, mixing or application, etc.

**TAAHHÜTNAME**

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği, etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.