

EC FERTILIZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ /
POLYCROP 12-15-9+ME

POLYCROP
12-15-9+ME

EC FERTILIZER
COLLATED NPK FERTILIZER /
POLYCROP 12-15-9+ME

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:

- POLYCROP**, tamamen suda çözünür ve yapraktan kolayca ve kısa sürede alınabilir özellikte bir gübredir.
- POLYCROP**, Bitkilerin Azot (N), Fosfor(P), Potasyum(K) ve Micro element ihtiyaçlarını karşılamada ve noksanlığını kısa sürede gidermede kullanmak üzere tasarlanmış bir bitki besin gübresidir.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Toplam Azot (N)	12
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	11
Üre Azotu (NH ₂ -N)	1
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	15
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	15
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	9
Suda Çözünür Çinko(Zn)	3

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU		
BİTKİLER	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN
PAMUK	1.Çiçek öncesi 2.Koza oluşum öncesi ve sonrasında 2-3 kez uygulanır.	40-60 g / 100 L su
BAĞ	İki, üç yaprakтан itibaren 10 gün arayla 3-4 kez uygulanması tavsiye edilir.	40-60 g / 100 L su
TÜM MEYVE AĞAÇLARI	1.Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme %70-80 iken 2.Meyvenin büyüme döneminde(Fındık büyüklüğü) 3.Hasattan bir hafta önce başlayarak 2-3 hafta uygulanır.	80-100 g / 100 L su
SEBZELER	1.Fidelerin dikiminden sonra 2.Çiçeklenme döneminde Not: Çiçeklenme isteği yüksek çeşitlerde (silor,kokteyl vs) 3.Hasat esnasında 15 gün arayla uygulanır.	40 g / 100 L su 40-60 g / 100 L su 100 -120 g /100 L su 60-80 g / 100 L su
ZEYTİN	Çiçek öncesi ve çiçeklenme dönemi boyunca 15 gün arayla uygulanır.	80-100 g / 100 L su
ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !		

UYARILAR!

*Önce Etiket Okuyunuz.*Yutmayınız.*Evde Kullanmayınız.*Uygulama sırasında Hiçbir Şey Yemeyiniz.*Deri ve Göz ile Temasından Kaçınız.*Kaza ile Teması halinde derhal bol sabunlu su ile yıkayınız ve medikal gözlem altına alınız. Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.-Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Depolama sıcaklığı: +4/+40°C

KARIŞABİLİRLİĞİ:

Bakır, kalsiyum sülfat karışımları ile karıştırmayınız. Mineral yağ ve asitlerle ön deneme yapmadan kullanmayınız. Tarım ilaçları, yaprak gübrelere ve mikro besin maddeleriyle karıştırılarak kullanılabilir.

FİRMA BEYANI:

ASANTA TARIM ENDUSTRI DIS TIC.LTD. STI. firması bu ürünün etiketinde bulunan kompozisyonu ve içeriği garanti eder. Firmanın kontrolü dışında yapılan manipölasyon, karışım, depolama ve uygulama hataları ve iklimsel faktörlerden dolayı oluşabilecek olan zararlardan sorumlu değildir.

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ / KEEP AWAY FROM CHILDREN



TAAHHÜTNAME

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği, etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

Üretici Firma / Manufacturer



**ASANTA TARIM ENDÜSTRİ
DİŞ TİC.LTD.ŞTİ**

**Çağlayan Mah.Barınaklar Blv.
Villa Güneş Apt. No:46/3
Muratpaşa/ANTALYA**

TEL : +90 242 324 34 99

FAX : +90 242 324 34 99

www.asantatarim.com

İBRAHİM TOLGA ULUŞAN

ASANTA TARIM ENDÜSTRİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÇAĞLAYAN MAH. BARINAKLAR BLV.
VİLLA GÜNEŞ NO:46/3 MURATPAŞA/ANTALYA
V. NO: 0860478427

Lisans No / Licence no: 1247

Tescil No / Registry no:

Üretim Tarihi/Production date:

Son Kul. Tarihi /Expiry date:

Parti ve Seri No/Parti & Serial no:

NET AĞIRLIK / NET WEIGHT:

FEATURES:

- POLYCROP** is a completely water soluble fertilizer which arranged the ratios of NPK that taken easily and in a short time into the plant from leaves.
- POLYCROP** is a plant nutritional fertilizer which is designed to be used in meeting the needs of Nitrogen (N), Phosphorous (P), Potassium (K) and Micro elements and in removing deficiency in a very short time.

GUARANTEED CONTENTS	% W/W
Total Nitrogen (N)	12
Ammonium Nitrogen (NH ₄ -N)	11
Ureic Nitrogen (NH ₂ -N)	1
Neutral Ammonium Citrate and Water Soluble Phosphorus Pentoxide (P ₂ O ₅)	15
Water Soluble Phosphorus Pentoxide (P ₂ O ₅)	15
Water Soluble Potassium Oxide (K ₂ O)	9
Water Soluble Zinc (Zn)	3

APPLICATION METHODE AND DOSE		
CROPS	USING PERIOD	BY FOLIAR
COTTON	1.Before flowers 2.Is applied 2-3 times before and after the cocoon (boll) formation.	40-60 g /100 L water
VINEYARDS	is recommended to be applied 3-4 times 10 days interval after two or three leaf formation	40-60 g /100 L water
FRUIT TREES	1.Before flowering and when flowering is 70-80% 2.At the period of Fruit growth (hazelnut size) 3.Applied 2-3 weeks, starting one week before harvest.	80-100 g /100 L water
VEGETABLES	1.After planting of the seedlings 2.At the period of fruit set Note: Varieties with high flowering requirements (silor, cocktail etc.) 3. During the harvest, applied 2-3 weeks interval.	40 g /100 L water 40-60 g / 100 L water 100-120 g / 100 L water 60-80 g / 100 L water
OLIVES	Is applied at 15-day intervals before and during the flowering period.	80-100 g /100 L water
NEVER EXCEED APPROPRIATE DOSAGE RATES !		

REMARKS!*

First, read the label.*Do not drink.*Do not use in house.*Do not eat anything during application.*Keep away from eye and skin contact.*By accident contact condition, wash your hands with plenty soapy water and call a doctor and show him the label or the pack. * Use only on needful place.*Never don't use over recommended dosage. It is recommended to use fertilizer by making soil and / or leaf analysis Store under normal conditions (cool and dry places) in the original packing. Storage temperature: +4/+40°C

MIXABILITY:

Do not mix with coppers, calcium sulphates mixtures. Do not use with mineral acids and oils without a previous essay. It can be mixed with pesticides, foliar fertilizers and micro-nutrients.

STATEMENT OF THE FIRM:

ASANTA TARIM ENDUSTRI DIS TIC. LTD. STI. guarantees the composition of the product and suitability for the purposes that are pursued and will never be held responsible of damage caused by any incorrect use of the product ,inadequate storage, climate condition, any incorrect handling, mixing or application, etc.