

EC FERTILIZER
NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Phyto-Fos 3-42-0

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:

* Bitkilerin toprağa nakli (şasırtma) esnasında, şasırtmadan sonraki ilk dönemde ve çiçek öncesi yapraktan ve topraktan kullanım için tasarlanmış Azot (N) ve yüksek Fosfor (P) içeren bir üründür.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Toplan Azot (N):	3
Üre Azotu (NH ₂ -N)	3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	42

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU		
BİTKİLER	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
SEBZELER (Hıyar, Biber, Patlıcan, Kabak Fasulye, Bezelye, Domates)	1.Hasat sonrası 2.Çiçeklenme dönemi: 100 ml (140g) /100 L su	15 günde bir tekrar: 500 ml (700g) /da.
	Nakil ve şasırtmalarda: Şasırtılacak fidelerin kök bölgesi, 3 ml (4.2 g) / L dozunda hazırlanan Phyto- Fos solüsyonuna bandırılır.	
PANCAR	Çiçek öncesi: 100 ml (140g) /100 L su	15 günde bir tekrar: 500 ml (700g) /da.
PATATES	Çiçek öncesi: 100 ml (140g) /100 L su	Yumru gelişme döneminde 3 uygulama: 500 ml (700g) /da.
KAVUN, KARPUZ	1.Kol oluşumunda 2.Çiçek öncesi: 100 ml (140g) /100 L su	500 ml (700g) /da.
PAMUK	1.Tarak başlangıcı 2.Çiçek öncesi: 100 ml (140g) /100 L su	
NARENCİYE (Limon, Portakal, Mandalina) MEYVE AĞAÇLARI (Elma, Armut, Erik, Kayısı, Şeftali, Kiraz, Vişne)	Çiçeklenmeyle birlikte gelişme döneminde 15-20 gün aralıklarla: 75-100 ml (105-140g) /100 L su	Mart, Temmuz, Eylül ayı sonunda olmak üzere 3 defa uygulanabilir. Kireçli topraklarda: 500 ml (700g) /da. Kireç oranı normal topraklarda: 400 ml (560g) /da.
BAĞ	1.Gelişme başlangıcı 2.Hasattan sonra: 50-75 ml (70-105g) /100 L su	İki uygulama; 1.Çiçeklenme öncesi: 500 ml (700g) /da. 2.Hasat sonrası: 500 ml (700g) /da.
TÜTÜN	1.Fide döneminde, 2.ilk çapadan sonra: 100-150 ml (140-210g) /100 L su	
MUZ	Doğum zamanı: 100-150 ml (140-210g) /100 L su	Doğum zamanı: 500 ml (700g) /da.
ÇİLEK, AHUDUDU	Şasırtmadan itibaren vejetatif gelişme dönemi boyunca 2-3 uygulama: 100 ml (140g) / 100 L su	İki uygulama; 1.Çiçeklenme öncesi: 500 ml (700g) /da. 2.Hasat sonrası: 500 ml (700g) /da.
BUĞDAY, ARPA, ÇELTİK, YULAF	Kardeşlenmede: 100 ml (140g) / da.	
ZEYTİN, FINDIK, CEVİZ, ANTEP FISTIĞI	1.Hasat sonrası , 2.Çiçeklenme döneminde: 75-100 ml (105-140g) /100 L su	İki uygulama; 1.Çiçeklenme öncesi : 500 ml (700g) /da. 2.Hasat sonrası: 500 ml (700g) /da.

UYARILAR !

*Önce Etiket Okuyunuz.*Yutmayınız.*Evde Kullanmayınız.*Uygulama sırasında Hiçbir Şey Yemeyiniz.*Deri ve Göz ile Temasından Kaçınınız.*Kaza ile Teması halinde derhal bol sabunlu su ile yıkayınız ve medikal gözlem altına alınız.*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. *Asla uygun doz oranını aşmayınız.*Sadece gerekli yerlerde kullanınız *Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. *Depolama Sıcaklığı: +4/+40°C

KARIŞABİLİRLİĞİ:

Bakır, kalsiyum sülfat karışımları ile karıştırmayınız. Mineral yağ ve asitlerle ön deneme yapmadan kullanmayınız. Tarım ilaçları, yaprak gübrelere ve mikro besin maddeleriyle karıştırılarak kullanılabilir.

FİRMA BEYANI:

ASANTA TARIM ENDÜSTRİ DİŞ TİC.LTD. STİ. Firması bu ürünün etiketinde bulunan kompozisyonu ve içeriği garanti eder. Firmanın kontrolü dışında yapılan manipölasyon, karışım, depolama, uygulama hataları ve iklimsel faktörlerden dolayı oluşabilecek olan zararlardan sorumlu değildir.

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ/ KEEP AWAY FROM CHILDREN



TAAHHÜTNAME: Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği, etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

Phyto-Fos
3-42-0

Üretici Firma / Manufacturer



**ASANTA TARIM ENDÜSTRİ
DİŞ TİC.LTD.ŞTİ**

**Çağlayan Mah.Barınaklar Blv.
Villa Güneş Apt. No:46/3
Muratpaşa/ANTALYA**

**TEL : +90 242 324 34 99
FAX : +90 242 324 34 99**

www.asantatarim.com

İBRAHİM TOLGA ULUŞAN

ASANTA TARIM ENDÜSTRİ DİŞ
TİCARET LİMİTED SİRKETİ
ÇAĞLAYAN MAH. BARINAKLAR BLV.
VİLLA GÜNEŞ NO:46/3 MURATPAŞA/ANTALYA
V. NO: 0866478427

Lisans No / Licence no: 1247
Tescil No / Registry no:
Üretim Tarihi/Production date:
Son Kul. Tarihi /Expiry date:
Parti ve Seri No/Parti & Serial no:

(Üretim Tarihi ve Parti No, etiket veya kapak üzerinde yazmaktadır./
Production Date and Part No are on the label or lid.)
1 L : 1,4 KG

NET AĞIRLIK / NET WEIGHT

FEATURES

* It is a product that contains Nitrogen (N) and high Phosphorus (P) which is designed for use from the leaves and soil before flowering during the first period after the planting (transplantation) of plants.

GUARANTEED CONTENTS	% W/W
Total Nitrogen (N)	3
Ureic Nitrogen (NH ₂ -N)	3
Water Soluble Phosphorus Pentaoxid (P ₂ O ₅)	42

APPLICATION METHODE AND DOSE		
CROPS	Via FOLIAR	Via SOIL
VEGETABLES (Tomatoes, peppers, cucumbers, eggplant,beans,peas, etc.)	1. After harvest, 2. Flowering period: 100 ml (140g) /100 L water	Re-application every 15 days: 500 ml (700g) /da.
	During the transplantation: The seedlings root zone is immersed into the prepared Phyto-Fos solution of the 3 ml (4.2 g) / L	
BEET	Applied before flower: 100 ml (140g) /100 L water	Re-application every 15 days: 500 ml (700g) /da.
POTATO	Applied before flower: 100 ml (140g) /100 L water	3 applications during tuber growth: 500 ml (700g) /da.
VATERMELON, MELON	1.Formation of the branch, 2.Before flower: 100 ml (140g) /100 L water	500 ml (700g) /da.
COTTON	1.Formation of cotton boll , 2.Before flower: 100 ml (140g) /100 L water	
CITRUS (Lemon, Orange, Mandarin) FRUIT TREES (Apple, Pear, Plum, Apricot, Peach, Cherry,)	With flowering, growth phase 15-20 day intervals: 75-100 ml (105-140g) /100 L water	It can be applied 3 times : at the end of March, July, September In soil Calcic: 500 ml (700g) /da. Lime rate in normal soil: 400 ml (560g) /da.
VINEYARDS	1. At the beginning of the development. 2 .After the harvest: 50-75 ml (70-105g) /100 L water	Two applications: 1.Pre-flowering, 2.After harvesting: 500 cc/da.
TOBACCO	1.At seedling period, 2.After first hoeing: 100-150 ml (140-210g) /100 L water	
BANANA	Birth time period: 100-150 ml (140-210g) /100 L water	Birth time period: 500 ml (700g) /da.
STRAWBERRY, RASPBERRY	2-3 applications during the vegetative development period from surprise: 100 ml (140g) / 100 L su	Two applications: 1.Pre-flowering, 500 ml (700g) /da. 2.After harvesting: 500 ml (700g) /da.
WHEAT, BARLEY, RICE, OATS	At tillering period: 100 ml (140g) / da.	
OLIVE, HAZELNUT,WALNUT, PISTACHIO	Two applications: 1.Pre-flowering, 2.After harvesting: 75-100 ml (105-140g) /100 L su	Two applications: 1.Pre-flowering: 500 ml (700g) /da. 2.After harvesting: 500 ml (700g) /da.

REMARKS !

*First, read the label.*Do not drink.*Do not use in house.*Do not eat anything during application.*Keep away from eye and skin contact.* By accident contact condition, wash your hands with plenty soapy water and call a doctor and show him the label or the pack. It is recommended to use fertilizer by making soil and / or leaf analysis. *Use only on needful place. *Never don't use over recommended dosage.*Storage temperature: +4/+40 °C

MIXABILITY:

Do not mix with coppers, calcium sulphates mixtures. Do not use with mineral acides and oils without a previous essay. It can be mixed with pesticides, foliar fertilizers and micro-nutrients.

STATEMENT OF THE FIRM:

ASANTA TARIM ENDÜSTRİ DİŞ TİC. LTD. STİ. guarantees the composition of the product and suitability for the purposes that are pursued and will never be held responsible of damage caused by any incorrect use of the product ,inadequate storage, climate condition, any incorrect handling, mixing or application, etc.