

ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE
Bio-Teradot

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Toplam Organik Madde	24
Organik Karbon	9
Toplam Azot (N)	1
Suda Çözünür Potasyum oksit (K ₂ O)	1
pH	4-6

Bio-Teradot

Üretici Firma/Manufacturer

ASANTA
TARIM ENDÜSTRİ DİŞ TİC.LTD.ŞTİ
Çağlayan Mah. Barnaklar Blv.Villa Güneş
Apt.No:46/3 Muratpaşa/ANTALYA
TEL&FAX : +90 242 324 34 99
www.asantatarim.com

ORGANIC PRODUCTS
PLANT ORIGIN LIQUID ORGANIC FERTILIZER
Bio-Teradot

GUARANTEED CONTENT	% W/W
Total Organic Matter	24
Organic Carbon	9
Total Nitrogen (N)	1
Water Soluble Potassium Oxide (K ₂ O)	1
pH:	4-6

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU				DOSAGE AND METHOD OF USE			
BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN UYGULAMA	TOPRAKTAN (Damlama sulama)	CROPS	APPLICATION PERIOD	BY FOLIAR	BY SOIL (Drip irrigation)
Tüm Sera Sebzeciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık,Fasülye, Çilek, Muz, v.s)	Yapraktan: Dikimden 20 gün sonra 10 gün ara ile hasat sonuna kadar uygulanır. Damlama Sulama: 1.Uygulama dikimden 10-15 gün sonra köklenme döneminde 2. Uygulama sezon ortasında	200-250 cc/100 lt su	1 - 1,5 lt /da.	All Greenhouse Vegetables (Tomato, Pepper, Eggplant, Cucumber, Bean, Strawberry, Banana, etc.)	By Foliar: It is applied 20 days after planting with an interval of 10 days until the end of the harvest. By Soil: 1st application 10-15 days after planting during rooting period 2nd application in the middle of the season	200-250 cc/100 lt water	1 - 1,5 lt /da.
Tüm Açık Alan Sebzeciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık,Fasülye, Çay, Çilek, v.s)	Yapraktan: Dikimden 20 gün sonra 10 gün ara ile hasat sonuna kadar uygulanır. Damlama Sulama: 1.Uygulama dikimden 10-15 gün sonra köklenme döneminde 2. Uygulama sezon ortasında	200-250 cc/100 lt su	1,5 - 2 lt /da.	All Open Field Vegetables. (Tomato, Pepper, Eggplant, Cucumber, Bean, Tea, Strawberry, etc.)	By Foliar: It is applied 20 days after planting with an interval of 10 days until the end of the harvest. By Soil: 1st application 10-15 days after planting during rooting period 2nd application in the middle of the season	200-250 cc/100 lt water	1,5 - 2 lt /da.
Tüm Yapraklı Yenen Sebzeler (Karnabahar, Pırasa, Ispanak, Marul, Kivırcık, Aysberg, v.s)	Yapraktan: Dikimden 20 gün sonra 10 gün ara ile hasat sonuna kadar uygulanır. Damlama Sulama: 1.Uygulama dikimden 10-15 gün sonra köklenme döneminde 2. Uygulama sezon ortasında	200-250 cc/100 lt su	1 - 1,5 lt /da.	All leaf edible vegetables (Cauliflower, Leek, Spinach, Lettuce, Curly lettuce, Iceberg lettuce, etc.)	By Foliar: It is applied 20 days after planting with an interval of 10 days until the end of the harvest. By Soil: 1st application 10-15 days after planting during rooting period 2nd application in the middle of the season	200-250 cc/100 lt water	1 - 1,5 lt /da.
Kavun, Karpuz, Kabak, Turp, Soğan, Havuç, Patates, v.s	Yapraktan: Dikimden 20 gün sonra 10 gün ara ile hasat sonuna kadar uygulanır. Damlama Sulama: 1.Uygulama dikimden 10-15 gün sonra köklenme döneminde 2. Uygulama sezon ortasında	200-250 cc/100 lt su	1 - 1,5 lt /da.	Melon, Watermelon, Squash, Radish, Onion, Carrot, Potato, etc.	By Foliar: It is applied 20 days after planting with an interval of 10 days until the end of the harvest. By Soil: 1st application 10-15 days after planting during rooting period 2nd application in the middle of the season	200-250 cc/100 lt water	1 - 1,5 lt /da.
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Ayva, Kiraz, Vişne, Bağ, Zeytin, Narenciye, v.s)	Üç uygulama tavsiye edilmektedir. 1.Tomurcuk ve çiçeklenmenin hemen öncesinde 2.Meyve oluşumunda 3.Hasat sonuna kadar	200-250 cc/100 lt su	2 - 2,5 lt /da. veya ağaç başına 100 cc/100 lt su / Ağaç	Fruit Trees: (Apple, Pear, Peach, Apricot, Quince, Cherry, Sour Cherry, Vineyard, Olive, Citrus, etc.)	Three applications are recommended: 1. Just before the bud and flowering 2. In fruit formation 3. Until the end of the harvest	200-250 cc/100 lt water	2 - 2,5 lt / da. Or per tree 100 cc / 100 lt water / tree.
Antep Fıstığı, Fındık, Badem, Ceviz	Dikiminden itibaren 15 gün ara ile 2 uygulama yapılır.	200-250 cc/100 lt su	2 - 2,5 lt /da.	Pistachio, Nuts, Almonds, Walnuts	It's apply 2 app. from planting onwards with 15 days interval.	200-250 cc/100 lt water	2 - 2,5 lt /da.
Tüm Tarla Bitkileri (Buğday, Arpa, Çeltik, Nohut, Mercimek, v.s)	İki uygulama yapılır; 1.nci uygulama: Yabancı ot ilaçlarıyla birlikte 2.nci uygulama: kardeşlenme döneminde	200-250 cc/100 lt su	1 lt /da.	All open field crops (Wheat, Barley, Rice, Chickpeas, Lentils, etc.)	Two application are made; 1.st app: together with herbicide 2nd app: during tillering period.	200-250 cc/100 lt water	1 lt /da.
Tüm Endüstri Bitkileri (Şekerpancarı, Yerfıstığı, Mısır, Soya, Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, v.s)	Bitkiler 5-10 cm boya ulaştıktan sonra,20 gün arayla 2 uygulama yapılır.	200-250 cc/100 lt su	2 - 2,5 lt /da.	All industrial plants (Sugarbeet, Groundnut, Corn, Soybean, Tobacco, Cotton, Sunflower, etc.)	It's made 2 app.with 20 days interval after the plants are 5-10 cm in height onwards.	200-250 cc/100 lt water	2 - 2,5 lt /da.
Kesme Çiçekçilik, Yeşil Alanlar	Dikiminden itibaren 15 gün ara ile hasat sonuna kadar 2 uygulama yapılır.	200-250 cc/100 lt su	2 - 2,5 lt /da.	Cut flowers ,Greenfields	It's made 2 app. with 15 days interval until the end of harvest from the planting onwards.	200-250 cc/100 lt water	2 - 2,5 lt /da.

UYARILAR!
*Önce Etiket Okuyunuz.*Yutmayınız.*Evde Kullanmayınız.*Uygulama sırasında Hiçbir Şey Yemeyiniz.*Deri ve Göz ile Temasından Kaçınız.*Kaza ile Teması halinde derhal bol sabunlu su ile yıkayınız ve medikal gözleml altına alınız. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. *Sadece gerekli olan yerlerde kullanılacaktır. Depolama Sıcaklığı: +4/+40 °C

KARIŞABİLİRLİĞİ
Bakır, Kalsiyum sülfat karışımları ile karıştırmayınız. Mineral yağ ve asitlerle ön deneme yapmadan kullanmayınız. Tarım ilaçları, yaprak gübreleri ve mikro besin maddeleri ile karıştırılarak kullanılabilir.

FİRMA BEYANI
ASANTA TARIM END.DİŞ TİC. LTD.ŞTİ ,bu ürünün etiketinde bulunan kompozisyonu ve içeriği garanti eder. Firmanın kontrolü dışında yapılan manipülasyon , karışım, depolama, uygulama hataları ve iklimsel faktörlerden dolayı oluşabilecek olan zararlardan sorumlu değildir.

Lisans No / Licence no: 891
Tescil No / Registry no:
Üretim Tarihi/Production date:
Son Kul. Tarihi /Expiry date:
Parti ve Seri No/Parti & Serial no:

**ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ
KEEP AWAY FROM CHILDREN**

Net Hacim / Net Volume :

REMARKS!
*First, read the label.*Do not drink.*Do not use in house.*Do not eat anything during application.*Keep away from eye and skin contact.*By accident contact condition, wash your hands with plenty soapy water and call a doctor and show him the label or the pack. It is recommended to use fertilizer by making soil and / or leaf analysis. *Use only on needful place. *Never don't use over recommended dosage. Storage temperature: +4/+40 °C

MIXABILITY
Do not mix with copper, calcium sulphate blends.Do not use mineral oil or acids without preliminary testing. It can be mixed with pesticides, foliar fertilizers and micronutrients.

STATEMENT OF THE FIRM
ASANTA TARIM END.DİŞ TİC. LTD.ŞTİ guarantees the composition of the product and suitability for the purposes that are pursued and will never be held responsible of damage caused by any incorrect use of the product ,inadequate storage, climate condition, any incorrect handling, mixing or application, etc.

TAAHHÜTNAME
Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği, etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynıysa olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.