ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE

Bio-Teramin

ORGANIC PRODUCTS
LIQUID ORGANIC FERTILIZER CONTAINING PLANT-DERIVED AMINO ACIDS.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Organik Madde……	30
Organik Karbon ……....	12
Organik Azot (N).....	2
Suda Çözünür Potasyum oksit (K_2O)	2
Serbest Amino Asitler…….....	6
pH	4-6

GUARANTEED CONTENTS	% W/W
Organic Matter	30
Organic Carbon	12
Organic Nitrogen (N)	2
Water Soluble Potassium Oxide (K_2O)	2
Free Amino Acids	6
pH:	4-6

BİTKİLER	KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU		
	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN UYGULAMA	TOPRAKTAN UYGULAMA
Sera sebzeleri	-İlk çıkıştan ya da fide dikiminden 10-15 gün sonra başlanarak hasat sonuna kadar	200-250 cc/100 lt.su	400-450 cc/da.
Açık alan sebzeleri	-İlk çıkıştan ya da fide dikiminden 10-15 gün sonra başlanarak hasat sonuna kadar	250-300 cc/100 lt.su	450-500 cc/da.
Yaprağı yenen sebzeler	-Gelişme dönemi boyunca	250-300 cc/100 lt.su	450-500 cc/da.
Şeker Pancarı	-Ekimden sonra(çıkış öncesinde) yabancı ot ilacı ile birlikte	200-250 cc/100 lt.su	450-500 cc/da.
Havuç, Patates vb.	Dikimden yada ilk sürgünlerin çıkmasından 15-30-45-60 gün sonra uygulanır.	200-250 cc/100 lt.su	450-500 cc/da.
Yumuşak çekirdekli meyveler	-Kök ve sürgün döneminin başladığı ilk bahar döneminde -Gelişme dönemi boyunca	200-250 cc/100 lt.su	450-500 cc/da.
Sert çekirdekli meyveler	-Kök ve sürgün döneminin başladığı ilk bahar döneminde -Gelişme dönemi boyunca	200-250 cc/100 lt.su	450-500 cc/da.
Çilek, Muz	-Fide dikiminden 10-15 gün sonra -Çiçeklenme döneminden itibaren	200-250 cc/100 lt.su	400-450 cc/da.
Turunçgiller	-Kök ve sürgün döneminin başladığı ilk bahar döneminde -Gelişme dönemi boyunca	200-250 cc/100 lt.su	500-550 cc/da
Zeytin, Ceviz, Badem vb.	-Kök ve sürgün döneminin başladığı ilk bahar döneminde -Gelişme dönemi boyunca	150-200 cc/100 lt.su	250-300 cc/da.
Bağ	-Kök ve sürgün döneminin başladığı ilk bahar döneminden hasada kadar. Hasat sonrası 15 gün arayla 2 uygulama	150-200 cc/100 lt.su	300-350 cc/da.
Tahıl, Hububat ve Endüstri bitkileri	-Kardeşlenme başlangıcında ve erken çiçek döneminde	300-350 cc/100 lt.su	350-400 cc/da

PLANTS	DOSAGE AND METHOD OF USE		
	APPLICATION TIME	BY FOLIAR	BY SOIL
Vegetables (Green house)	-Starting 10-15 days after planting the seedlings or first germination until the end of harvest	200-250 cc/100 lt. water	400-450 cc/da.
Vegetables (Open field)	-Starting 10-15 days after planting the seedlings or first germination until the end of harvest	250-300 cc/100 lt. water	450-500 cc/da.
Leafy vegetables	-During the development period	250-300 cc/100 lt. water	450-500 cc/da.
Sugar Beet,	-After sowing (before first germination) together with the herbicides	200-250 cc/100 lt. water	450-500 cc/da.
Carrot, Potato etc.	-Apply after 15-30-45 and 60 days from planting or sprouting	200-250 cc/100 lt. water	450-500 cc/da.
Soft-core fruit.	- During the first spring period of rooting and sprouting - During the development period	200-250 cc/100 lt. water	450-500 cc/da.
Hard-core fruit	- During the first spring period of rooting and sprouting - During the development period	200-250 cc/100 lt. water	450-500 cc/da.
Strawberry, Banana	- 10-15 days after planting the seedlings - After flowering	200-250 cc/100 lt. water	400-450 cc/da.
Citrus	- During the first spring period of rooting and sprouting - During the development period	200-250 cc/100 lt. water	500-550 cc/da
Olives, Walnuts, Almonds etc.	- During the first spring period of rooting and sprouting - During the development period	150-200 cc/100 lt. water	250-300 cc/da.
Grape Vineyard	- Until harvest from during the first spring period of rooting and sprouting. 2 applications with 15 days interval after the harvest	150-200 cc/100 lt. water	300-350 cc/da.
Cereals, grains and industrial crops	- At the beginning of tillering and during the early flower period	300-350 cc/100 lt. water	350-400 cc/da

UYARILAR!
*Önce Etiketi Okuyunuz. *Yutmayınız. *Evde Kullanmayınız. *Uygulama sırasında Hiçbir Şey Yemeyiniz. *Deri ve Göz ile Temasından Kaçınınız. *Kaza ile Teması halinde derhal bol sabunlu su ile yıkayınız ve medikal gözlem altına alınız. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. *Sadece gerekli olan yerlerde kullanılacaktır. Depolama Sıcaklığı: +4/+40 ºC

KARIŞABİLİRLİĞİ
Bakır, Kalsiyum sülfat karışımları ile karıştırmayınız. Mineral yağ ve asitlerle ön deneme yapmadan kullanmayınız. Tarım ilaçları, yaprak gübreleri ve mikro besin maddeleri ile karıştırılarak kullanılabilir.

FİRMA BEYANI
ASANTA TARIM END.DIŞ TİC. LTD.ŞTİ, bu ürünün etiketinde bulunan kompozisyonu ve içeriği garanti eder. Firmanın kontrolü dışında yapılan manipülasyon, karışım, depolama, uygulama hataları ve iklimsel faktörlerden dolayı oluşabilecek olan zararlardan

REMARKS!
*First, read the label. *Do not drink. *Do not use in house. *Do not eat anything during application. *Keep away from eye and skin contact.
*By accident contact condition, wash your hands with plenty soapy water and call a doctor and show him the label or the pack. It is recommended to use fertilizer by making soil and / or leaf analysis. *Use only on needful place. *Never don't use over recommended dosage
Storage temperature: +4/+40 ºC

MIXABILITY
Do not mix with copper, calcium sulphate blends. Do not use mineral oil or acids without preliminary testing. It can be mixed with pesticides, foliar fertilizers and micronutrients.

STATEMENT OF THE FIRM
ASANTA TARIM END.DIŞ TİC. LTD.ŞTİ guarantees the composition of the product and suitability for the purposes that are pursued and will never be held responsible of damage caused by any incorrect use of the product, inadequate storage, climate condition, any

Üretici Firma/Manufacturer
ASANTA TARIM ENDÜSTRİ DIŞ TİC.LTD.ŞTİ
Çağlayan Mah. Barınaklar Blv. Villa Güneş Apt. No:46/3 Muratpaşa/ANTALYA
TEL : +90 242 324 34 99
FAX : +90 242 324 34 99
www.asantatarim.com

İBRAHİM TOLGA ULUŞAN
ASANTA TARIM ENDÜSTRİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÇAĞLAYAN MAH. BARINAKLAR BLV. VİLLA GÜNEŞ NO:46/3 MURATPAŞA/ANTALYA
V. NO: 0860478427

Lisans No / Licence no:
Tescil No / Registry no:
Üretim Tarihi/Production date:
Son Kul. Tarihi /Expiry date:
Parti ve Seri No/Parti & Serial no:

Net Hacim/ Net Volume
1-5-10-15-20-35 LT

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ
KEEP AWAY FROM CHILDREN

TAAHHÜTNAME
Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği, etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.