

EC FERTILIZER  
BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ  
(Bakır Nitrat İçerikli)

**ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:**

**CUPRASİN;** Bitkilerin Bakır (Cu) ihtiyaçlarını karşılamada ve noksanlığını gidermede ihtiyaç duyulan her dönemde kullanılabilen, yaprak ve kökler tarafından bitki bünyesine hızlı ve kolay alınabilen, bitkide ve meyvede leke yapmayan bakırlı bir gübre çözeltisidir.

**GARANTİ EDİLEN İÇERİK** **% W/W**  
Suda Çözünür Bakır (Cu) **6**

**CUPRASİN**

Üretici Firma/Manufacturer



ASANTA TARIM ENDÜSTRİ  
DİŞ TİC.LTD.ŞTİ  
Çağlayan Mah.Barınaklar Blv. Villa Güneş Apt. No:46/3  
Muratpaşa/ANTALYA  
TEL : +90 242 324 34 99  
FAX : +90 242 324 34 99  
[www.asantatarim.com](http://www.asantatarim.com)

EC FERTILIZER  
CUPPER FERTILIZER SOLUTION  
( With Cupper Nitrate )

**FEATURES**

**CUPRASİN;** It is a copper fertilizer solution that can be used in any period needed to meet the copper (Cu) needs of plants and to eliminate its deficiency, can be quickly and easily taken into the plant body by leaves and roots, and does not stain plants and fruits.

**GUARANTEED RICHNESSE** **% w/w**  
Water soluble Cupper (Cu): **6**

| KULLANIM ALANI, ŞEKLİ VE MİKTAR                                                 |                                                                                                                     |                             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| KULLANIM ALANI                                                                  | UYGULAMA ZAMANI                                                                                                     | DAMLAMADAN ( 1 ton su ile ) | YAPRAKTAN (100 lt su ile) |
| Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Fasulye, Bezelye                | Dikimden 1-2 hafta sonra 2-3 uygulama                                                                               | 0,5 lt. / da.               | 75-100 cc                 |
| Marul, Ispanak, Lahana, Maydanoz, Karnabahar, Enginar                           | *Erken ilkbaharda yapraklı dönemde, -Çapadan sonra 15 gün ara ile 2 uygulama, * Bbiçim yapıldıktan sonra 1 uygulama | 0,5 lt. / da.               | 75-100 cc                 |
| Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak                                                 | Erken ilkbaharda yapraklı dönemde, çapadan sonra 15 gün ara ile 2 uygulama                                          | 0,5 lt / da.                | 75-100 cc                 |
| MEYVELER                                                                        |                                                                                                                     |                             |                           |
| Narenciye: Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt vb.                             | Çiçek öncesi ve sonrası 2 uygulama                                                                                  | 1 lt./da.                   | 100 cc                    |
| *Sert ve Yumuşak çekirdekli: Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Nar vb. | *Erken ilkbaharda ağaçların gözleri uyanmadan önce 1 uygulama                                                       | 1 lt./da                    | 100 cc                    |
| Zeytin, Antep Fıstığı, Badem, Fındık, Ceviz                                     | *Hasattan 10-15 gün sonra 1 uygulama                                                                                |                             |                           |
| Bağ                                                                             | 1.Yapraklar %70-80 döküldüğünde                                                                                     | 0,5 lt / da.                | 75-100 cc                 |
|                                                                                 | 2.Gözlerin uyanma zamanı                                                                                            |                             |                           |
|                                                                                 | 3.Sürgünler 10-15 cm olunca                                                                                         |                             |                           |
|                                                                                 | 4.Çiçek sonrası                                                                                                     |                             |                           |
|                                                                                 | 5.Koruk dönemi sonrası                                                                                              |                             |                           |
| Çilek                                                                           | Fide toprağa tutunduktan sonra 2-3 uygulama                                                                         | 0,5 lt / da.                | 75-100 cc                 |
| Muz                                                                             | *Bitki meyveye oturmadan 15 gün önce 1 uygulama, *Meyveye oturduktan sonra 20 gün arayla 2 uygulama                 | 1,5 lt / da.                | 50-75 cc                  |
| ENDÜSTRİ BİTKİLERİ                                                              |                                                                                                                     |                             |                           |
| Pamuk, Soya fasulyesi, Yer fıstığı, Mısır, Mercimek, Nohut                      | Çapadan sonra 15 gün ara ile 2 uygulama                                                                             | 0,5 lt. / da.               | 75-100 cc                 |
| Tütün, Çay, Ayçiçeği, Şeker pancarı                                             | Çapadan sonra 15 gün ara ile 2 uygulama                                                                             | 1 lt./da                    | 75-100 cc                 |
| Kesme çiçekçilik, Yeşil alanlar                                                 | Yapraklanma dönemi ve sonrası                                                                                       | 1 lt./da                    | 50-75 cc                  |
| HUBUBAT                                                                         |                                                                                                                     |                             |                           |
| Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf, Kanola                                             | Kardeşlenme dönemi ve 15 gün sonra 2 uygulama yapılır.                                                              | 1 lt./da                    | 75-100 cc                 |

**UYARILAR:** \*Önce Etiket Okuyunuz. \* Yutmayınız. \* Evde Kullanmayınız. \* Uygulama sırasında Hiçbir Şey yemeyiniz. \*Deri ve Göz ile Temasından Kaçınınız. \*Kaza ile Teması halinde derhal bol sabunlu su ile yıkayınız ve medikal gözlem altına alınız. \* **Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. \*Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. \* Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. \*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Depolama Sıcaklığı: +4/+40°C**

**KARIŞILIRLIĞI** Kuvvetli alkali (Bordo bulamacı) ve asidik ilaçlar ile karışmaz. Diğer bitki besleme ürünleri ve birçok zirai ilaçlar ile karışabilir. Karıştırmadan önce test edilmesi veya tek başına kullanılması tavsiye edilir.

**FİRMA BEYANI**

ASANTA TARIM ENDUSTRI DIS TIC. LTD. STI. Firması bu ürünün etiketinde bulunan kompozisyonu ve içeriği garanti eder. Firmanın kontrolü dışında yapılan manipülasyon, karışım, uygulama hataları, depolama ve iklimsel faktörlerden dolayı oluşabilecek olan zararlardan sorumlu değildir.



Lisans No / Licence no:  
Tescil No / Registry no:  
Üretim Tarihi/Production date:  
Son Kul. Tarihi /Expiry date:  
Parti ve Seri No/Parti & Serial no:  
NET AĞIRLIK /Net weight:

| APPLICATION METHODS AND DOSES                                                           |                                                                                                                                              |                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| CROPS                                                                                   | APPLICATION PERIOD                                                                                                                           | Via soil ( with 1 ton of water ) | Via Foliar ( with 100 lt of water ) |
| Tomato, Pepper, Eggplant, Cucumber, Melon, Watermelon, Bean, Pea                        | 1-2 weeks after planting, 2-3 applications                                                                                                   | 0,5 lt. / da.                    | 75-100 cc                           |
| Lettuce, Spinach, Cabbage, Parsley, Cauliflower, Artichoke                              | * In the leafy period in early spring, *2 applications with an interval of 15 days after the anchor, * 1 application after cutting (harvest) | 0,5 lt. / da.                    | 75-100 cc                           |
| Potatoes, Carrots, Onions, Garlic                                                       | 2 applications in early spring, during the leafy period, with an interval of 15 days after the hoe.                                          | 0,5 lt / da.                     | 75-100 cc                           |
| FRUITS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                  |                                     |
| Citrus: Orange, Lemon, Mandarin, Grapefruit etc.                                        | 2 applications before and after flower                                                                                                       | 1 lt./da.                        | 100 cc                              |
| *Hard and Soft Seed Fruits: Apple, Pear, Apricot, Peach, Plum, Cherry, Pomegranate etc. | * 1 application before the eyes of the trees wake up in early spring                                                                         | 1 lt./da                         | 100 cc                              |
| Olive, Pistachio, Almond, Hazelnut, Walnut                                              | * 1 application after the trees shed their leaves after harvest                                                                              |                                  |                                     |
| Vineyard                                                                                | 1. When the leaves fall 70-80%                                                                                                               | 0,5 lt / da.                     | 75-100 cc                           |
|                                                                                         | 2.It's time for the fruit bud to wake up                                                                                                     |                                  |                                     |
|                                                                                         | 3. When the shoots are 10-15 cm                                                                                                              |                                  |                                     |
|                                                                                         | 4. Post flower                                                                                                                               |                                  |                                     |
|                                                                                         | 5. After berry touch, before ripening period                                                                                                 |                                  |                                     |
| Strawberry                                                                              | 2-3 applications after the seedling clings to the soil                                                                                       | 0,5 lt / da.                     | 75-100 cc                           |
| Banana                                                                                  | *1 application 15 days before the plant sits in the fruit, *2 applications 20 days apart after sitting on the fruit                          | 1,5 lt / da.                     | 50-75 cc                            |
| INDUSTRIAL PLANTS                                                                       |                                                                                                                                              |                                  |                                     |
| Cotton, Soybean, Peanut, Corn, Lentil, Chickpea                                         | 2 applications with an interval of 15 days after the anchor                                                                                  | 0,5 lt. / da.                    | 75-100 cc                           |
| Tobacco, Tea, Sunflower, Sugar Beet                                                     | 2 applications with an interval of 15 days after the anchor                                                                                  | 1 lt./da                         | 75-100 cc                           |
| Cut floristry, Green spaces                                                             | The foliation period and after                                                                                                               | 1 lt./da                         | 50-75 cc                            |
| CEREALS                                                                                 |                                                                                                                                              |                                  |                                     |
| Wheat, Barley, Paddy, Oats, Canola                                                      | Two applications are made after the tillering period and 15 days later.                                                                      | 1 lt./da                         | 75-100 cc                           |

**REMARKS!** \*First, read the label. \*Do not drink. \*Do not use in house. \*Do not eat anything during application.\*Keep away from eye and skin contact.\*By accident contact condition, wash your hands with plenty soapy water and call a doctor and show him the label or the pack. \* Use only on needful place. \*Never don't use over recommended dosage. Store under normal conditions (cool and dry places) in the original packaging. It is recommended to use fertilizer by making soil and / or leaf analysis. Storage temperature: +4/+40 °C

**MIXABILITY:** It does not mix with strong alkali (Bordeaux Slurry) and acidic drugs. It can be mixed with other plant nutrition products and many pesticides. It is recommended to be tested before mixing or used alone.

**STATEMENT OF THE FIRM**

ASANTA TARIM ENDUSTRI DIS TIC. LTD. STI. guarantees the composition of the product and suitability for the purposes that are pursued and will never be held responsible of damage caused by any incorrect use of the product, inadequate storage, climate condition. anv incorrect handling. mixing or application. etc.



**TAAHHÜTNAME** : Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği, etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.