

EC FERTILIZER
DEMİRLİ GÜBRE ÇÖZELTİSİ
(DEMİR SÜLFAT İÇERİKLİ)
Ferrolin Liquid



Ferrolin Liquid

EC FERTILIZER
FERROUS FERTILIZER SOLUTION
(CONTAINING IRON SULFATE)
Ferrolin Liquid

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Suda Çözünür Demir (Fe)	% 6

Lisans No / Licence no: 1247
Tescil No / Registry no:
Üretim Tarihi/Production date:
Son Kul. Tarihi /Expiry date:
Parti ve Seri No/Parti & Serial no:

GUARANTEED CONTENT	% W/W
Water Soluble Iron (Fe)	%6

NET AĞIRLIK /Net Weight

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU			
BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN (100 lt su ile)	DAMLA SULAMADAN
SEBZELER; Domates, Biber, Patlıcan, Hiyar, Kabak, Fasulye, Bezelye, Bamya, Enginar vb.	Fideler şaşırtıldıktan bir hafta sonra başlayarak meyve olgunlaşana kadar 3-4 uygulama	100-150 cc	250-400 cc/da.
YAPRAĞI YENEN KIŞLIK SEBZELER; Marul- Kivırcık-Lahana, Pırasa, Ispanak vb.	Fide döneminden itibaren 15 gün ara ile sezon boyunca	100-150 cc	350-500 cc/da.
YUMRULU BİTKİLER; Şekerpancarı, Soğan, Sarımsak, Patates. Şalgam, Havuç, vb.	İkinci çapadan sonra 21 gün arayla sezon boyunca uygulanır	150-200 cc	350-500 cc/da.
MEYVE AĞAÇLARI; Elma, Armut, Kaysı, Badem, Erik, Kiraz, Ayva, Şeftali, Nar, İncir, Zeytin vb.	Meyve bağlama, büyüme ve hasat öncesine kadar 2-3 uygulama	150-200 cc	500-600 cc/da. veya 50 cc/ağaç
Çiçek, Ahududu, Yaban Mersini	Çiçek öncesi ve meyve bağlama döneminde 2-3 uygulama yapılır.	100-150 cc	250-400 cc/da.
Fındık, Antep fıstığı, Ceviz, Badem	Çiçek öncesi, Meyve tutumu, meyve büyüme ve hasat öncesi 2-3 uygulama	150-200 cc	500-600 cc/da. veya 50 cc/ağaç
Muz	Meyve oluşumu öncesi ve sonrası 2-3 uygulama yapılır	150-200 cc	500-600 cc/da. veya 50 cc/ağaç
Bağcılık (Üzüm)	Meyve bağlama, büyüme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulama yapılır	150-200 cc	400-500 cc/da. veya 10 cc/omca
Kavun, Karpuz, Kabak	İkinci çapadan sonra 21 gün ara ile sezon boyunca uygulanır	150-200 cc	500-600 cc/da.
BAKLAGİLLER; Nohut, Mercimek, Fasulye, Soya fasulyesi, Yer fıstığı	İkinci çapadan sonra 21 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır	150-200 cc	500-600 cc/da.
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ; Pamuk, Mısır, Çay, Ayçiçeği, Kanola, Tütün	İkinci çapadan sonra 21 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır	150-200 cc	500-600 cc/da.
HUBUBAT, TARLA BİTKİLERİ Buğday, Arpa, Çeltik, Mercimek, Nohut vb.	Yabancı ot ilacı ile ve Kardeşlenme dönemi ve sonrası 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.	150-200 cc	----
YEŞİL ALAN VE YEM BİTKİLERİ; Yonca, Korunga, Fiğ, vb.	Her biçimden 10 gün sonra uygulanır.	150-200 cc	-----
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Yapraklanma dönemi ve sonrasında sezon boyunca haftalık uygulama yapılır	100-150 cc	250-400 cc/da.

APPLICATION METHODE AND DOSE			
CROP	APPLICATION PERIOD	VIA FOLIAR (with 100 lt water)	VIA DRIP IRRIGATION
VEGETABLES; Tomato, Pepper, Eggplant, Cucumber, Zucchini, Bean, Pea, Okra, Artichoke etc.	3-4 applications starting one week after the seedlings are transplanted until the fruit ripens.	100-150 cc	250-400 cc/da.
WINTER VEGETABLES THAT EAT LEAF; Lettuce- Curly-Cabbage, Leek, Spinach etc.	Throughout the season with an interval of 15 days from the seedling period.	100-150 cc	350-500 cc/da.
TUBEROUS PLANTS; Sugar Beet, Onion, Garlic, Potato. Turnip, Carrot, etc.	During the season with 21 days intervals after the second anchor	150-200 cc	350-500 cc/da.
FRUIT TREES; Apple, Pear, Apricot, Almond, Plum, Cherry, Quince, Peach, Pomegranate, Fig, Olive etc.	2-3 applications until fruit setting, growing and before harvest	150-200 cc	500-600 cc/da. or 50 cc/tree
Strawberry, Raspberry, Blueberry	2-3 applications during pre-flowering and fruit setting period	100-150 cc	250-400 cc/da..
Hazelnut, Pistachio, Walnut, Almond	2-3 applications before flowering, fruit set, fruit growth and pre-harvest	150-200 cc	500-600 cc/da. or 50 cc/tree
Banana	2-3 applications before and after fruit formation	150-200 cc	500-600 cc/da. or 50 cc/tree
Viticulture (Grape)	2-3 applications during the fruit setting, growing and coloring period	150-200 cc	400-500 cc/da. or 10 cc/omca
Melon, Watermelon, Pumpkin	During the season with an interval of 21 days after the second anchor.	150-200 cc	500-600 cc/da
LEGUMES; Chickpeas, Lentils, Beans, Soybeans, Peanuts	2-3 applications with 21 days interval after the second hoe.	150-200 cc	500-600 cc/da
INDUSTRIAL PLANTS; Cotton, Corn, Tea, Sunflower, Canola, Tobacco	2-3 applications with 21 days interval after the second hoe.	150-200 cc	500-600 cc/da
CEREALS, FIELD CROPS Wheat, Barley, Paddy, Lentil, Chickpea etc.	2-3 applications at 15-day intervals, together with herbicide and during and after tillering.	150-200 cc	----
GREENFIELD AND FEED CROPS; Clover, Sainfoin, Fig, etc.	Applied after 10 days of each cut.	150-200 cc	-----
CUT FLOWER	Weekly application during the foliation period and afterwards throughout the season.	100-150 cc	250-400 cc/da.

UYARILAR!

*Önce Etiketini Okuyunuz.*Yutmayınız.*Evide Kullanmayınız.*Uygulama sırasında Hiçbir Şey yemeyiniz. *Deri ve Göz ile Temasından Kaçınınız.*Kaza ile Teması halinde derhal bol sabunlu su ile yıkayınız ve medikal gözlem altına alınız. *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. *Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. *Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direk güneş ışığına maruz bırakmayınız. Depolama Sıcaklığı: +4/+40°C

KARIŞILIRLIĞI:

Bakır, kalsiyum sülfat vb. alkali reaksiyon gösteren ürünlerle karıştırmayınız. Mineral yağ ve asitlerle, ön deneme yapmadan kullanmayınız. Tarım ilaçları, yaprak gübreleri ve mikro besin maddeleriyle karıştırılarak kullanılabilir. Kullanmadan önce karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI:

ASANTA TARIM ENDUSTRI DIS TIC. LTD. STI. Firması bu ürünün etiketinde bulunan kompozisyonu ve içeriği garanti eder. Firmanın kontrolü dışında yapılan manipülasyon, karışım, uygulama hataları ve iklimsel faktörlerden dolayı oluşabilecek olan zararlardan sorumlu değildir.

Üretici Firma/Manufacturer



ASANTA TARIM ENDÜSTRİ DİŞ TİC.LTD.ŞTİ
Çağlayan Mah. Barnaklar Blv.Villa Güneş Apt.
No:46/3 Muratpaşa/ANTALYA
TEL & Fax : +90 242 324 34 99
www.asantatarim.com

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ
/KEEP AWAY FROM CHILDREN



REMARKS!

*First, read the label.*Do not drink.*Do not use in house.*Do not eat anything during application.*Keep away from eye and skin contact.*By accident contact condition, wash your hands with plenty soapy water and call a doctor and show him the label or the pack.*Never don't use over recommended dosage. Use only on needful place It is recommended to use fertilizer by making soil and/or leaf analysis. Store under normal conditions (cool and dry places) in the original packaging. Do not expose the product to direct sunlight. Storage temperature: +4/+40 °C

MIXABILITY:

Do not mix with products with alkaline reaction, such as copper, calcium sulfate, etc. Do not use with mineral oils and acids without preliminary testing. It can be used by mixing with pesticides, foliar fertilizers and micronutrients. It is recommended to test the mixture before use.

STATEMENT OF THE FIRM:

ASANTA TARIM ENDUSTRI DIS TIC. LTD. STI. guarantees the composition of the product and suitability for the purposes that are pursued and will never be held responsible of damage caused by any incorrect use of the product .inadequate storage. climate condition. anv incorrect handling. mixing or application. etc.

TAAHHÜTNAME: Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği, etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynıysa olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.