

EC FERTILIZER

BOR(B), BAKIR(Cu-Sülfat), DEMİR(Fe-Sülfat), MANGAN(Mn-Sülfat), MOLİBDEN(Mo) ve ÇİNKO(Zn-Sülfat)

MIKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

MicroMix

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:

MicroMix , özellikle bitki besin yetersizliği nedeniyle mikro element eksiklikleri oluşumunu önlemek veya eksiklikleri ortadan kaldırmak için katı / toz formda formüle edilmiş bir üründür.

MicroMix , yüksek çözülebilirlik sayesinde gübreleme yada su kültürü sırasında doğrudan toprakta çözülebildiği gibi sulama suyunda da çözülebilir.

MicroMix , bahçe bitkileri üretimi, meyve ağaçları v.s için gerekli mikro besin maddelerinin tamamını dengeli bir oranda ihtiva eder.

MicroMix

Üretici Firma/Manufacturer



ASANTA TARIM ENDÜSTRİ DİŞ TİC.LTD.ŞTİ
Çağlayan Mah. Barınaklar Blv. Villa Güneş
Apt. No:46/3
Muratpaşa/ANTALYA
TEL&FAX : +90 242 324 34 99
www.asantatarim.com

EC FERTILIZER

BORON(B), CUPER(Cu-Sulfate), IRON(Fe-sulfate), MANGANESE(Mn-sulfate), MOLYBDENUM(Mo) and ZINC(Zn-Sulfate)

MICTURE OF MICRO PLANT NUTRIENTS

MicroMix

FEATURES:

MicroMix is a product formulated as solid/powder form particularly to prevent the formation of micro-element deficiencies due to lack of plant nutrients or to help eliminate the deficiencies

MicroMix can apply to the soil directly owing to high solubility during fertilisation or in the irrigation water. also can be solve in the watering water.

MicroMix contains all the microelements necessary for the preparation of balanced fertilizers for application to crops such as horticultural produce, plants, fruit trees etc.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU			
BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	%80 çiçek döküldükten sonra: Hasattan sonra yeşil aksama:	100-150 g/ 100 L su 100 g/ 100 L su	1,5 kg/ da (20-25 ağaç için)
MEYVE AĞAÇLARI	Çiçeklenme öncesi uygulanır		1-1,5 kg/da
MUZ	Çiçek taç yaprakları döküldükten sonra 15 gün aralık ile 2 uygulama.	300 g/100 L su (yağmurlama sistemi)	
BAĞLAR	Çiçek tutumundan önce: Meyve tutumunda: Hasattan 1 ay önce:	50-75 g/ 100 L su 50-75 g/ 100 L su 50-75 g/ 100 L su	05-1 kg/ da
ANTEP FISTIĞI	%80 çiçek döktüğü zaman: Taneler buğday iriliğinde:	50-75 g/ 100 L su 50-75 g/ 100 L su	
MISIR, AYÇİÇEĞİ	Bitki boyu 45 cm olduğunda (Traktörün son giriminde):	100 g/ da	
PAMUK	Çiçek öncesi Taraklanma başlangıcı Hasattan 45 gün önce :	100 g/ da 100 g/ da 100 g/ da	
ZEYTİN	Çiçeklenme döneminde: Nohut iriliğinden önce: Hasattan 45 gün önce	100 g/ 100 L su 100 g/ 100 L su 100 g/ 100 L su	1,5 kg/ da (20-25 ağaç için)
LAHANA, KARNABAHAAR, BEZELYE, FASULYE	4-6 yapraklı dönemde, gerek görüldüğünde aynı dozda tekrarlanır.	100 g/ 100 L su	1,5 kg/ da
PATATES, ŞEKERPANCARI	Yeşil aksam toprak üzerine çıktığında:	100 g/ da	1 kg/ da
HUBUBAT (Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Çeltik, Nohut, Mercimek)	1.nci uygulama: bitki 10 cm olduğunda 2.nci uygulama: bitki 30-40 cm olduğunda	75-100 g/ da 75-100 g/ da	
SEBZELER (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, kabak v.s.)	Dikimden 15 gün sonra: Meyve tutumundan önce:	50-75 g/ 100 L su 50-75 g/ 100 L su	0,5-1 kg / da
YAPRAKTAN UYGULAMA ; Genel doz 75-100 gr /100 lt suya			

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Suda çözünür Bor(B)	1,5
Suda çözünür Bakır(Cu)	0,5
Suda çözünür Demir(Fe)	4
Suda çözünür Mangan (Mn)	3
Suda çözünür Molibden (Mo)	0,06
Suda çözünür Çinko (Zn)	4

Lisans No / Licence no: 1247
Tescil No / Registry no: 18352
Üretim Tarihi/Production date:
Son Kul. Tarihi /Expiry date:
Parti ve Seri No/Parti & Serial no:
NET AĞIRLIK /NET WEIGHT

UYARILAR! *Önce Etiket Okuyunuz.*Yutmayınız.*Evde Kullanmayınız.*Uygulama sırasında Hiçbir Şey Yemeyiniz.*Deri ve Göz ile Temasından Kaçınız.*Kaza ile Teması halinde derhal bol sabunlu su ile yıkayınız ve medikal gözlem altına alınız.*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. *Asla uygun doz oranını aşmayınız.*Sadece gerekli yerlerde kullanınız.*Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. *Depolama Sıcaklığı: +4/+40°C

KARIŞILIRLIĞI

Bakır, kalsiyum sülfat karışımları ile karıştırmayınız. Mineral yağ ve asitlerle ön deneme yapmadan kullanmayınız. Tarım ilaçları, yaprak gübreleri ve mikro besin maddeleriyle karıştırılarak kullanılabilir.

FİRMA BEYANI

ASANTA TARIM ENDÜSTRİ DİŞ TİC. LTD. ŞTİ. Firması bu ürünün etiketinde bulunan kompozisyonu ve içeriği garanti eder. Firmanın kontrolü dışında yapılan manipülasyon, karışım, uygulama hataları ve iklimsel faktörlerden dolayı oluşabilecek olan zararlardan sorumlu değildir.

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ/ KEEP AWAY FROM CHILDREN



APPLICATIONS & DOSE

CROPS	APPLICATION PERIOD	BY FOLIAR	BY SOIL
CITRUS	After pouring 80% flower: To the green parts after harvest:	100-150 gr/ 100 L water 100 gr/ 100 L water	1,5 kg/ da (for 20-25 trees)
FRUIT TREES	Before floring		1-1,5 kg/da
BANANAS	Applied after flower poured petals. Made two application at 15 days intervals.	300 gr/100 L water (sprinkler system)	
VINEYARDS	At exclusive flower set: At fruit set: One month before harvest:	50-75 g/ 100 L water 50-75 g/ 100 L water 50-75 g/ 100 L water	05-1 kg/ da
PISTACHIO	After 80%defloration: After the grains become wheat size:	50-75 g/ 100 L water 50-75 g/ 100 L water	
CORN, SUNFLOWER	When the plant is 45 cm (at last harvest of tractor)	100 g/ da	
COTTON	Before flowering At start of Cotton bolls 45 days ago from harvest:	100 g/ da 100 g/ da 100 g/ da	
OLIVE	During flowering: When the chick pea size 45 days ago from harvest:	100 g/ 100 L water 100 g/ 100 L water 100 g/ 100 L water	1,5 kg/ da (for 20-25 trees)
CABBAGE, CAULIFLOWER, PEAS, BEANS	Applied at 4-6 leaf stage. Repeated with same dosage if necessary.	100 g/ 100 L water	1,5 kg/ da
POTATOES, SUGAR BEET	After green component has come over the soil	100 g/ da	1 kg/ da
CEREALS (Wheat, Barley, Oats, Rye, Rye, Chickpeas, Lentils)	1st application: when the plant is 10 cm 2nd application: when the plant is 30-40 cm	75-100 g/ da 75-100 g/ da	
VEGETABLES (Tomato, Pepper, Eggplant, Cucumber, Zucchini etc.)	15 days later from planting: Before fruit set:	50-75 g/ 100 L water 50-75 g/ 100 L water	0,5-1 kg / da
FOLIAR APPLICATION; General dose 75-100 gr / 100 lt water			

GUARANTEED CONTENT

	% W/W
Water soluble Boron(B)	1,5
Water soluble Copper(Cu)	0,5
Water soluble Iron (Fe)	4
Water soluble Manganese (Mn)	3
Water soluble Molybdenum(Mo)	0,06
Water soluble Zinc (Zn)	4

REMARKS! *First, read the label.*Do not drink.*Do not use in house.*Do not eat anything during application.*Keep away from eye and skin contact.* By accident contact condition, wash your hands with plenty soapy water and call a doctor and show him the label or the pack. It is recommended to use fertilizer by making soil and / or leaf analysis. *Use only on needful place. *Never don't use over recommended dosage.*Storage temperature: +4/+40 °C

MIXABILITY

Do not mix with coppers, sulphocalcic mixtures as with calcium, or with mineral oils without a previous essay. It can be mixed with pesticides, foliar fertilizers and micro-nutrients.

STATEMENT OF THE FIRM

ASANTA TARIM ENDÜSTRİ DİŞ TİC. LTD. ŞTİ. guarantees the composition of the product and suitability for the purposes that are pursued and will never be held responsible of damage caused by any incorrect use of the product ,inadequate storage, climate condition, any incorrect handling, mixing or application, etc.

İBRAHİM TOLGA ULUŞAN

ASANTA TARIM ENDÜSTRİ DİŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÇAĞLAYAN MAH. BARINAKLAR BLV.
VİLLA GÜNEŞ NO:46/3 MURATPAŞA/ANTALYA
V. NO: 9869478427

TAAHHÜTNAME: Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği, etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynıysa olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.