

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER
SIVI DENİZ YOSUNU
ALGİNAS

ALGİNAS

ORGANIC SOURCED PRODUCTS
LIQUID SEA ALGAE
ALGİNAS

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Organik Madde	25
Suda çözünür Potasyum oksit (K ₂ O)	6
Alginiik asit	0,6
Giberallik asit	10 ppm
Maksimum EC (dS/m)	21
pH:	8-10

Üretici Firma/Manufacturer



ASANTA TARIM ENDÜSTRİ
DİŞ TİC.LTD.ŞTİ
Çağlayan Mah.Barınaklar Blv. Villa Güneş Apt. No:46/3
Muratpaşa/ANTALYA
TEL : +90 242 324 34 99
FAX : +90 242 324 34 99
www.asantatarim.com

GUARANTEED RICHNESSE	% w/w
Organic Matter	25
Water-soluble Potassium Oxide (K ₂ O)	6
Alginiic acid	0,6
Gibberellic acid	10 ppm
Maximum EC (dS/m)	21
pH: 8-10	



KULLANIM ALANI, ŞEKLİ VE MİKTAR			
BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	Damlama, Yağmurlama veya Sprinkten	YAPRAKTAN (100 lt su ile)
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Fasulye, Bezelye vb.	Bitkinin ilk dönemlerinde (2.çiçeğe kadar) 1 uygulama, 2.nci çiçekten hasada kadar 2-3 uygulama.	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
Maydanoz, Marul, Ispanak, Lahana, Karnabahar, Enginar, Havuç, Soğan, Sarımsak, Pırasa, Pancar	*4-6 yapraklı dönemde, *ilk uygulamadan 2-3 hafta sonra	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
Patates	*Bitkinin ilk dönemlerinde (2.çiçeğe kadar) 1 uygulama, *ikinci çiçekten hasada kadar 2-3 uygulama.	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
MEYVELER			
Narenciye: Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt vb.	Çiçek öncesi, Meyve oluştuktan sonra, Meyveler ceviz iriliğinde iken tek uygulama	1,5 - 2 lt. / da.	300 cc
*Sert ve Yumuşak çekirdekli: Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Nar, Kivi, Zeytin, Antep Fıstığı, Badem, Fındık, Ceviz	*1.nci uygulama: Çiçek sonrası, *2.nci uygulama: ilk uygulamadan 2-3 hafta sonra	1,5 - 2 lt. / da.	300 cc
Bağ	1. Sürgünler 15-20 cm olunca 2.Çiçekten önce 3.İnce koruk oluşum döneminde 4.Tatlı su yürümeden önce, meyve gelişim döneminde	1,5 - 2 lt. / da.	300 cc
Çiçek, Ahududu	1.Çiçek öncesi 2.Birinci uygulamadan sonra 15 gün arayla 2 defa	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
Muz	İmardan (Onarım) hemen sonra ve hevenk(dal) doğumundan önce uygulanır	1,5 - 2 lt. / da.	300 cc
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ			
Pamuk, Soya fasulyesi, Yer fıstığı, Mısır, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği	3-5 yaprak oluştuktan sonra, 15 gün arayla hasada kadar	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
Tütün, Çay	1.Çapadan sonra 2.İlk kırımından sonra	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
Şeker pancarı	1.Kök büyümesi başladığında 2.Şeker birikimi başladığında 3.Hasattan 1,5 ay önce	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
Kesme çiçekçilik, Yeşil alanlar	Yapraklanma döneminden itibaren 10-15 gün arayla 3-4 uygulama	1-1,5 lt./da	200 cc
HUBUBAT			
Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf, Kanola	Kardeşlenme dönemi ve 15 gün sonra 2 uygulama yapılır.	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc

APPLICATION METHODS AND DOSES			
CROPS	APPLICATION PERIOD	Drip or Sprinkler system	Via Foliar (with 100 lt of water)
Tomato, Pepper, Eggplant, Cucumber, Zucchini, Beans, Peas etc.	* 1 application in the early stages of the plant (up to the 2nd flower), * 2-3 applications from second flower to harvest.	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
Parsley, Lettuce, Spinach, Cabbage, Cauliflower, Artichoke, Carrot, Onion, Garlic, Leek, Beet	* In the period of 4-6 leaves, * 2-3 weeks after the first application	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
Potato	* 1 application in the early stages of the plant (up to the 2nd flower), * 2-3 applications from second flower to harvest.	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
FRUITS			
Citrus: Orange, Lemon, Mandarin, Grapefruit etc.	"Before flower", "After fruit formation", "When fruits are walnut-sized" single application	1,5 - 2 lt. / da.	300 cc
*Hard and Soft seeds: Apple, Pear, Apricot, Peach, Plum, Cherry, Pomegranate, Kiwi, Olive, Pistachio, Almond, Hazelnut, Walnut	*1st application: After flower, *2nd application: 2-3 weeks after the first application	1,5 - 2 lt. / da.	300 cc
Vineyard	*When the shoots are 15 -20 cm * Before the flower * During the thin berry formation period * During the fruit development period, before the start of sweet water	1,5 - 2 lt. / da.	300 cc
Strawberry, Raspberry	* Before flower * After the first application, 2 times with an interval of 15 days	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
Banana	Immediately after Reconstruction (Repair) and before bunch birth	1,5 - 2 lt. / da.	300 cc
INDUSTRIAL CROPS			
Cotton, Soybean, Peanut, Corn, Lentil, Chickpea, Sunflower	After 3-5 leaves are formed, until harvest with 15 days intervals	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
Tobacco, Tea	1.After the anchor 2.After first harvest	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
Sugar beet	* When root growth begins * When sugar accumulation begins * 1.5 months before harvest	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
Cut floristry, Green spaces	* 3-4 applications with 10-15 days intervals from the leafing period	1-1,5 lt./da	200 cc
CEREALS			
Wheat, Barley, Paddy, Oats, Canola	Two applications are made during the tillering period and after 15 days.	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc

UYARILAR: *Önce Etiket Okuyunuz. * Yutmayınız. * Evde Kullanmayınız. * Uygulama sırasında Hiçbir Şey yemeyiniz. * Deri ve Göz ile Temasından Kaçınınız. * Kaza ile Teması halinde derhal bol sabunlu su ile yıkayınız ve medikal gözlem altına alınız. * **Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. *Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.** Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Depolama Sıcaklığı: +4/+30°C

KARİŞİBİLİRLİĞİ: Birçok gübre ve zirai ilaç ile karışabilir. Karıştırmadan önce test edilmesi tavsiye edilir.
FİRMA BEYANI: ASANTA TARIM ENDÜSTRİ DİŞ TİC. LTD. ŞTİ. Firması bu ürünün etiketinde bulunan kompozisyonu ve içeriği garanti eder. Firmanın kontrolü dışında yapılan manipülasyon, karışım, uygulama hataları, depolama ve iklimsel faktörlerden dolayı oluşabilecek olan zararlardan sorumlu değildir.

Lisans No / Licence no:
Tescil No / Registry no:
Üretim Tarihi/Production date:
Son Kul. Tarihi /Expiry date:
Parti ve Seri No/Parti & Serial no:
NET AĞIRLIK /Net weight:
NET HACİM / Net Volume:

REMARKS! *First, read the label. * Do not drink. * Do not use in house. * Do not eat anything during application. * Keep away from eye and skin contact. * By accident contact condition, wash your hands with plenty soapy water and call a doctor and show him the label or the pack. * **Use only on needful place. * Never don't use over recommended dosage.** Store under normal conditions (cool and dry places) in the original packaging. It is recommended to use fertilizer by making soil and / or leaf analysis. Storage temperature: +4/+30 °C
MIXABILITY: It can be mixed with many fertilizers and pesticides. It is recommended to test before mixing.

STATEMENT OF THE FIRM:

ASANTA TARIM ENDÜSTRİ DİŞ TİC. LTD. ŞTİ. guarantees the composition of the product and suitability for the purposes that are pursued and will never be held responsible of damage caused by any incorrect use of the product, inadequate storage, climate condition, any incorrect handling, mixing or application, etc.



TAAHHÜTNAME : Pıvasava sunacağımız ürünün içeriği, etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin anyısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.